

Cu 200




u **Meď (Cu)** je nevyhnutná pre zdravý rast a vývoj, pre tvorbu peľu a tiež je dôležitá v procese hnojenia u samoopelivých rastlín. Tento prvok sa podieľa na syntéze vitamínu A, ktorý je nevyhnutný pre syntézu bielkovín. Nedostatok medi sa prejavuje na listoch chlorózou, stratou turgoru a vädnutím. Rast a vývoj stoniek rastlín je spomalený a znižuje sa najmä tvorba semien. Príznaky nedostatku medi sú zjavné predovšetkým na mladých častiach rastlín. Komplexné pôsobenie zložiek hnojiva zaisťuje intenzívnejší vývoj koreňov v skorých štádiách vývoja, rýchlejšiu regeneráciu rastlín po zimnom období, tvorbu bočných výhonkov a ich pevnosť, odolnosť proti skorému šíreniu chorôb.

ZLOŽENIE

	Množstvo %	Množstvo g/l
Meď (Cu)	14,0	200
Dusík (N)	6,0	85
Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	6,0	85
pH (1:10 H ₂ O)	2,5-4,0	
Hustota 20°C, g/ml	1,45-1,5	

VÝHODY:

- pozitívne ovplyvňuje úrodotvorný proces, zvyšuje odolnosť rastlín voči chorobám, reguluje hospodárenie s vodou.
- podporuje tvorbu koreňových vláskov, stimuluje
- syntézu bielkovín, sacharidov a tukov, zvyšuje odolnosť rastlín voči nepriaznivým podmienkam
- a chorobám, stimuluje fotosyntézu, metabolizmus živín a energie,
- rastliny narastú zdravšie a silnejšie.



BALENIE



Odporúčané dávkovanie hnojiva IKAR Cu 200:

Plodiny	Dávka	Spôsob a termín hnojenia
Obilniny	0,2-0,5 l/ha	Foliárna aplikácia - vhodné na prihnojovanie na začiatku rastu (teplota +10°C, postrek pred mrazom -1°C neodporúčame)
Olejniny		
Strukoviny		
Repa		
Kukurica		
Zemiaky	0,1-0,5 l/100 l vody	
Zelenina	0,1-0,5 l/100 l vody / zálievka 0,3-0,5% roztok	Foliárna aplikácia / zálievka na začiatku vegetácie
Bobuľové kríky		Foliárna aplikácia /zálievka na začiatku vegetácie a po zbere
Záhradné rastliny		Foliárna aplikácia /zálievka na začiatku a na konci vegetácie
Okrasné rastliny a sadenice		Foliárna aplikácia/zálievka na zintenzívnenie rastu rastlín

*Roztok 0,1 – 0,3 % (100 – 300 ml/ 100 l vody). Ak sa Cu 200 použije ako fungicíd, vypočíta sa podľa aktívnej látky.

KOMPATIBILITA

CU 200 je možné použiť v zmesiach s mnohými inými hnojivami a pesticídmi (insekticídy, fungicídy). **Nepoužívajte** s výrobkami obsahujúcimi sírany, minerálne oleje a alkalické výrobky (pH > 8). Pred zmiešaním sa odporúča pripraviť malé množstvo zmesi. Tak sa skontroluje, či sa v nich nevytvára sediment. Takisto sa odporúča prípravok najskôr nastriekať na malú plochu, čím sa zistí prípadný fytotoxický účinok na rastliny.