




A termék növényi eredetű **biostimulánsokat** és **szabad aminosavakat** tartalmaz. Regulátorként működik, amely megállítja a növény túlnyúlását, megrövidíti a szártagokat, kiváltja és serkenti a bokrosodást, az ágaképződést, a virágzást és a különböző részek kialakulását, valamint növeli a terméshozamot. A vegetációs időszak végén történő alkalmazása javítja a termés minőségét. A termékben található **biostimulánsok** stimulálják a növények természetes fejlődési folyamatait, és segítenek megbirkózni a stresszel. A kritikus növekedési szakaszokban hatással vannak a növények élettani fejlődési folyamataira. Növeli a terméshozamot, és jelentősen javítja a termelést.

ELŐNYÖK:

- Szabályozza a növény növekedését, gátolja az apikális dominanciát, serkenti a bokrosodást, és elősegíti a szárok kifejlődését,
- növeli a vitaminok és a cukrok mennyiségét, serkenti a fehérje felhalmozódását a gabonafélékben, és felgyorsítja a további zsírok felhalmozódását az olajos magvakban,
- javítja a gyökéreképződést, a termék jelentős hatással van a gyökerek növekedésére,
- felgyorsítja a fotoszintézist,
- növeli a makrotrágyák hatékonyságát, serkenti a tápanyagok felszívódását,
- felgyorsítja a virágzást és az érést.

ÖSSZETÉTEL

	Mennyiség %	Mennyiség g/l
Biostimulánsok	0,7	8,6
Aminosavak	4,0	50
Nitrogén (N)	1,0	12,4
Szerves Nitrogén (N-org)	1,0	12,4
Foszfor (P ₂ O ₅)	9,0	112,4
Kálium (K ₂ O)	10,0	124
Bór (B)	0,4	5
Molibdén (Mo)	0,2	2,4
Szerves anyagok	13,0	
pH (1:10 H ₂ O)	6,0-7,0	
Sűrűség 20 °C, g/m	1,22-1,3	



CSOMAGOLÁS



Ajánlás a **Revolt** kijuttatására:

Növény	Dózis	Kijuttatás módja és ideje
Gabonafélék	0,5-1,0 l/ha	Levéltrágyázás: BBCH 29-31 – a bokrosodás serkentésére, BBCH 32-37 – a növény megnyúlásának megállítására és a szár megerősítésére, BBCH 37-49 – a termés minőségének javítására
Olajos magvak		Levéltrágyázás: a 3-5 leveles időszaktól a zöld bimbózás és a növekedés időszakáig 1-2 alkalommal
Hüvelyesek		Levéltrágyázás: I. 15 cm-es magasságnál, II. a virágzás kezdetekor
Borsó		Levéltrágyázás: 1 alkalommal, amikor a növények elérik a 10 cm-es magasságot
Kukorica		Permetezés 1 alkalommal 2-4 levél jelenlétekor
Cukorrépa		Levéltrágyázás: 30 nappal a betakarítás előtt a minőségi jellemzők javítása érdekében
Burgonya/Zöldségek	0,3-0,5 l/100 l víz	A palántázás után 2-3 héttel és a virágzás előtt 1-2 alkalommal a leveleken alkalmazandó (150 ml/100 l víz)
Zöldségek	0,3-0,5 l/100 l víz / öntözés 0,2-0,5%	A palántázás után 2-3 héttel és a virágzás előtt alkalmazandó (150 ml/100 l víz)
Bogyós gyümölcsűek		A virágzás előtt és közvetlenül virágzás után 1-2 alkalommal a leveleken alkalmazandó (75-150 ml/100 l víz). Csonthéjas gyümölcsökön nem alkalmazható
Kerti növények		2-3 héttel a palántázás után és a virágzás előtt 1-2 alkalommal a leveleken alkalmazandó (100-250 ml/100 l víz)

* Oldat: 0,2-0,5% (200-500 ml /100 l víz)

Fontos: a termék használata során 10-15 nap szünetet kell tartani az alkalmazások között.

A fő műtrágya mennyiségének növelése a nagyobb terméshozam elérése érdekében.

KOMPATIBILITÁS

Az *Revolt* számos műtrágyával és növényvédő szerrel (rovarölő, gombaölő) keverékben használható. **Ne használja** nagy mennyiségű réz (Cu), ként (S), ásványi olajokat tartalmazó termékekkel, valamint lúgos termékekkel (pH>8). Nitrogént (N) és aminosavakat tartalmazó termékekkel nem keverhető. Bekeverés előtt ajánlatos először kis mennyiségű keveréket készíteni, annak ellenőrzésére, hogy nincs-e üledék. Ajánlatos először kis területen permetezni, annak ellenőrzésére, hogy nincs-e fitotoxikus hatása a növényekre.